

REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA
LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ
Kollárova č. 2, 031 80 Liptovský Mikuláš

Tel.: 044-5523814, 5522679, 5521931, Fax: 044-5521932, E-mail: ZdravieZvierat.LM@svps.sk

OBEC Malatíny		Obce a mestá v okrese L. Mikuláš		
Dátum:	Registraturny znak:			
26 -03- 2019				
Podacie číslo: 116/2019	Číslo spisu: Váš list :	Náš list : 1207/2019 - 1	Vybavuje : MVDr. Sokolská	Liptovský Mikuláš 25.3.2019
Prilohy:	Vybavuje:			

Vec: Orálna vakcinácia líšok proti besnote – jarná kampaň – oznamenie a poučenie

Regionálna veterinára a potravinová správa Liptovský Mikuláš príslušná podľa zákona NR SR č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti Vám oznamuje, že v čase od **1.4. – 14.4.2019** (posun je možný podľa počasia) bude v okrese Liptovský Mikuláš vykonaná orálna vakcinácia líšok proti besnote. Vakcina bude pokladaná letecky z letiska Poprad s denzitou pokladania – **25 vakcinačných dávok na 1 km²**, z výšky 50 metrov nad terénom pri rýchlosťi 150 km/hod., v dvoch letových liniach navzájom vzdialených 500 m. Pri leteckom pokladaní sa vynechajú územia s nadmorskou výškou nad 1200 metrov, vodné plochy, cestné komunikácie, mestá, osady a pásma ochrany prírody, kde nie je možné lietať v požadovanej výške.

Poučenie o vakcinačnej návnade - LYSVULPEN por. a. u. v.: obsahuje modifikovaný oslabený vakcinačný kmeň besnoty SAD Bern, pomnožený v bunkových kultúrach, antibiotiká a stabilizačné médium. Zmes je naplnená do plastikových toboliek (blistrov), ktoré sú obalené návnadovou hmotou s tetracyklínom. Tetracyklín slúži ako indikátor vakcinácie. Návnada je čierohnedej farby, guľatého alebo hranatého tvaru, pevnej konzistencie. Vo vnútri návnady je uložená plastiková tobolka (blister) s viacjazyčnou potlačou "Pozor - vakcina proti besnote". Obsah tobolky (vakcinačný antigén so stabilizačným médiom) je načervenalej farby. Pri požití návnady líškou sa tobolka s vakcínou perforuje a vakcina pride do kontaktu so sliznicou dutiny ústnej. Cestou lymfatického systému sa vyvolá imunogénný efekt.

Manipulácia s vakcinačnými návnadami a bezpečnostné opatrenia : Pre človeka je vakcinačná návnada pri bežnom zaobchádzaní neškodná. Z bezpečnostného hľadiska a z dôvodu zabránenia prenosu ľudského pachu na vakcinačnú návnadu doporučujeme nedotýkať sa jej a obmedziť voľný pohyb psov po dobu 14 dní od ukončenia leteckej pokladky. Ak sa obsah blistra zapracovaného v návnade dostane na ruky, je potrebné ruky ihned umyť vodou a mydlom. Ak sa obsah blistra dostane na sliznicu úst, nosa alebo očí človeka, je potrebné okamžite vyhľadať lekárske ošetrenie.

Na základe vyššie uvedených informácií Vás žiadame o informovanie verejnosti zverejnením na obvyklom mieste prípadne vyhlásením v miestnom rozhlasu.

MVDr. Ján Stupka
riaditeľ
RVPS L. Mikuláš